

Información sobre la vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas. SIREVA II. OPS. 2022
Neisseria meningitidis

Información sobre los aislamientos invasores

Año:

2022

País

ARGENTINA

Institución

INEI-ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán"

Responsable

Adriana M. Efron: amefron@anlis.gob.ar; Alejandra Corso: acorso@anlis.gob.ar

Tablas

[Tabla 1. Número de aislamientos de Neisseria meningitidis por grupo de edad y sexo.](#)

[Tabla 2. Número de aislamientos invasores de Neisseria meningitidis por enfermedad y por grupos de edad.](#)

[Tabla 3. Número de aislamientos invasores de Neisseria meningitidis por grupo de edad y fuente.](#)

[Tablas 4. Distribución de los serogrupos capsulares de los aislamientos invasores Neisseria meningitidis por grupo de edad y enfermedad.](#)

[Tabla 5. Sensibilidad antimicrobiana de Neisseria meningitidis por grupo de edad.](#)

Instrucciones:

instrucciones.

1. Haga clic en la tabla que va a diligenciar.
2. Cuando termine de diligenciar la tabla, vaya al final de ella y haga clic en "volver a la página general", para seleccionar la siguiente tabla.
3. Por favor, diligencie todos los cuadros,

Tabla 1. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos por grupo de edad y sexo. 2022

| Grupos de edad | Sexo | | | | | | Total | |
|---------------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|
| | Masculino | | Femenino | | Sin dato | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| < 12 meses | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0.0 | 6 | 22.2 |
| 12-23 meses | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 24-59 meses | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.5 |
| Subtotal (1) | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 0 | 0.0 | 11 | 40.7 |
| 5-14 años | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.5 |
| 15-29 años | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 3 | 11.1 |
| 30-49 años | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.5 |
| Subtotal (2) | 5 | 38.5 | 8 | 61.5 | 0 | 0.0 | 13 | 48.1 |
| 50-59 años | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.7 |
| ≥ 60 años | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 7.4 |
| Subtotal (3) | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 3 | 11.1 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Sin dato | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 12 | 44.4 | 15 | 55.6 | 0 | 0.0 | 27 | 100.0 |

[Volver a la página general](#)

Tabla 2. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos invasores por enfermedad y grupo de edad. 2022

| Grupos de edad | Diagnóstico | | | | | | | | Total | |
|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|
| | Meningitis | | Meningitis y sepsis | | Sepsis | | Otra* | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| < 12 meses | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 6 | 22.2 |
| 12-23 meses | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 24-59 meses | 3 | 60.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 5 | 18.5 |
| Subtotal (1) | 4 | 36.4 | 0 | 0.0 | 5 | 45.5 | 2 | 18.2 | 11 | 40.7 |
| 5-14 años | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.5 |
| 15-29 años | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 3 | 11.1 |
| 30-49 años | 4 | 80.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.5 |
| Subtotal (2) | 11 | 84.6 | 0 | 0.0 | 2 | 15.4 | 0 | 0.0 | 13 | 48.1 |
| 50-59 años | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.7 |
| ≥ 60 años | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 7.4 |
| Subtotal (3) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 11.1 |
| Sin dato | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 15 | 55.6 | 0 | 0.0 | 8 | 29.6 | 4 | 14.8 | 27 | 100.0 |

[Volver a la página general](#)

*** Especificar cual otra enfermedad por grupo de edad**

| Otra enfermedad (número) | | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------|----------|--|-------|
| Grupo de edad en meses y años | artritis | bacteriemia | neumonía | | Total |
| < 12 meses | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 12-23 meses | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 24-59 meses | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 5-14 años | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 15-29 años | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 30-49 años | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 50-59 años | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ≥ 60 años | 0 | 2 | 0 | | 2 |
| Sin dato | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Total | 0 | 4 | 0 | | 4 |

Tabla 3. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos invasores por grupo de edad y fuente. 2022

| Grupos de edad | Fuente | | | | | | Total | |
|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|------------|-----------|--------------|
| | Hemocultivo | | LCR | | Otros líquidos estériles* | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| < 12 meses | 6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 22.2 |
| 12-23 meses | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 24-59 meses | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.5 |
| Subtotal (1) | 8 | 72.7 | 3 | 27.3 | 0 | 0.0 | 11 | 40.7 |
| 5-14 años | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.5 |
| 15-29 años | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 3 | 11.1 |
| 30-49 años | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.5 |
| Subtotal (2) | 4 | 30.8 | 9 | 69.2 | 0 | 0.0 | 13 | 48.1 |
| 50-59 años | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.7 |
| ≥ 60 años | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 7.4 |
| Subtotal (3) | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 11.1 |
| Sin dato | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 15 | 55.6 | 12 | 44.4 | 0 | 0.0 | 27 | 100.0 |

[Volver a la página general](#)

***Especificar**

| Otros líquidos corporales normalmente estériles (número) | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--------------|
| Grupo de edad en meses y años | liquido sinovial | | | Total |
| < 12 meses | | | | 0 |
| 12-23 meses | | | | 0 |
| 24-59 meses | | | | 0 |
| 5-14 años | | | | 0 |
| 15-29 años | | | | 0 |
| 30-49 años | | | | 0 |
| 50-59 años | | | | 0 |
| ≥ 60 años | | | | 0 |
| Sin dato | | | | 0 |
| Total | | | | 0 |

Tablas 4. *Neisseria meningitidis*. Distribución de los serogrupos de los aislamientos invasores por grupo de edad y diagnóstico

a. Niños < 12 meses

| Grupos de edad | Serogrupo | Diagnóstico | | | | Total | |
|----------------|-----------|-------------|---------------------|--------|------|-------|-------|
| | | Meningitis | Meningitis y Sepsis | Sepsis | Otra | | |
| | | n | | | | n | % |
| < 12 meses | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| < 12 meses | B | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 100.0 |
| < 12 meses | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| < 12 meses | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| < 12 meses | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| < 12 meses | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| < 12 meses | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| < 12 meses | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| < 12 meses | NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| < 12 meses | Total | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 100.0 |

b. Niños de 12-23 meses

| Grupos de edad | Serogrupo | Diagnóstico | | | | Total | |
|----------------|-----------|-------------|---------------------|--------|------|-------|-----|
| | | Meningitis | Meningitis y Sepsis | Sepsis | Otra | | |
| | | n | | | | n | % |
| 12-23 meses | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12-23 meses | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12-23 meses | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12-23 meses | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12-23 meses | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12-23 meses | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12-23 meses | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12-23 meses | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12-23 meses | NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12-23 meses | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

c. Niños de 24-59 meses

| Grupos de edad | Serogrupo | Diagnóstico | | | | Total | |
|----------------|-----------|-------------|---------------------|--------|------|-------|------|
| | | Meningitis | Meningitis y Sepsis | Sepsis | Otra | | |
| | | n | | | | n | % |
| 24-59 meses | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24-59 meses | B | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 80.0 |
| 24-59 meses | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24-59 meses | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.0 |
| 24-59 meses | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24-59 meses | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24-59 meses | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24-59 meses | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24-59 meses | NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24-59 meses | Total | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 100 |

d. Niños de 5-14 años

| Grupos de edad | Serogrupo | Diagnóstico | | | | Total | |
|----------------|-----------|-------------|---------------------|--------|------|-------|-------|
| | | Meningitis | Meningitis y Sepsis | Sepsis | Otra | | |
| | | n | | | | n | % |
| ≥ 5 a 14 años | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 5 a 14 años | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 |
| ≥ 5 a 14 años | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 |
| ≥ 5 a 14 años | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 5 a 14 años | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 5 a 14 años | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 5 a 14 años | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 5 a 14 años | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 5 a 14 años | NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 5 a 14 años | Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0 |

e. Personas 15-29 años

| Grupos de edad | Serogrupo | Diagnóstico | | | | Total | |
|----------------|-----------|-------------|---------------------|--------|------|-------|-------|
| | | Meningitis | Meningitis y Sepsis | Sepsis | Otra | | |
| | | n | | | | n | % |
| 15-29 años | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15-29 años | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
| 15-29 años | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15-29 años | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 |
| 15-29 años | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15-29 años | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
| 15-29 años | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15-29 años | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15-29 años | NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15-29 años | Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0 |

f. Personas 30 a 49 años

| Grupos de edad | Serogrupo | Diagnóstico | | | | Total | |
|----------------|-----------|-------------|---------------------|--------|------|-------|-------|
| | | Meningitis | Meningitis y Sepsis | Sepsis | Otra | | |
| | | n | | | | n | % |
| 30-49 años | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30-49 años | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 |
| 30-49 años | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.0 |
| 30-49 años | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 |
| 30-49 años | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30-49 años | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30-49 años | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30-49 años | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30-49 años | NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30-49 años | Total | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100.0 |

g. Personas 50 a 59 años

| Grupos de edad | Serogrupo | Diagnóstico | | | | Total | |
|----------------|-----------|-------------|---------------------|--------|------|-------|-----|
| | | Meningitis | Meningitis y Sepsis | Sepsis | Otra | | |
| | | n | | | | n | % |
| 50-59 años | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|---|---|---|-------|
| 50-59 años | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50-59 años | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50-59 años | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 50-59 años | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50-59 años | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50-59 años | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50-59 años | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50-59 años | NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50-59 años | Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |

h. Personas ≥ 60 años

| Grupos de edad | Serogrupo | Diagnóstico | | | | Total | |
|----------------|-----------|-------------|---------------------|--------|------|-------|-------|
| | | Meningitis | Meningitis y Sepsis | Sepsis | Otra | | |
| | | n | | | | n | % |
| ≥ 60 años | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 60 años | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 60 años | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 |
| ≥ 60 años | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 60 años | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 60 años | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 |
| ≥ 60 años | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 60 años | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 60 años | NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ≥ 60 años | Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |

i. Sin dato de edad

| Grupos de edad | Serogrupo | Diagnóstico | | | | Total | |
|------------------|-----------|-------------|---------------------|--------|------|-------|-----|
| | | Meningitis | Meningitis y Sepsis | Sepsis | Otra | | |
| | | n | | | | n | % |
| Sin dato de edad | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sin dato de edad | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|---|---|---|---|-----|
| Sin dato de edad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sin dato de edad | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sin dato de edad | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sin dato de edad | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sin dato de edad | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sin dato de edad | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sin dato de edad | NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sin dato de edad | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

[Volver a la página general](#)

co 2022

Tabla 5. *Neisseria meningitidis*. Sensibilidad antimicrobiana. 2022

Crterios: CLSI 2022

| Sensibilidad | Grupos de edad | n | Penicilina (CIM) | | | | | |
|--------------|----------------|----|------------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | | Sensibles | | Intermedia | | Resistente | |
| | | | n | % | n | % | n | % |
| Penicilina | < 12 meses | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| Penicilina | 12-23 meses | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| Penicilina | 24-59 meses | 3 | 1 | 33.3333 | 2 | 66.6667 | 0 | 0 |
| Penicilina | Subtotal (1) | 7 | 2 | 28.5714 | 5 | 71.4286 | 0 | 0 |
| Penicilina | 5-14 años | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| Penicilina | 15-29 años | 3 | 1 | 33.3333 | 2 | 66.6667 | 0 | 0 |
| Penicilina | 30-49 años | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Penicilina | Subtotal (2) | 13 | 4 | 30.7692 | 9 | 69.2308 | 0 | 0 |
| Penicilina | 50-59 años | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Penicilina | ≥ 60 años | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Penicilina | Subtotal (3) | 3 | 1 | 33.3333 | 2 | 66.6667 | 0 | 0 |
| Penicilina | Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penicilina | Total | 23 | 7 | 30.4348 | 16 | 69.5652 | 0 | 0 |

| Sensibilidad | Grupos de edad | n | Rifampicina (CIM) | | | | | |
|--------------|----------------|---|-------------------|-----|------------|---|------------|---|
| | | | Sensibles | | Intermedia | | Resistente | |
| | | | n | % | n | % | n | % |
| Rifampicina | < 12 meses | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----|----|-----|---|---|---|---|
| Rifampicina | 12-23 meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | 24-59 meses | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | Subtotal (1) | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | 5-14 años | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | 15-29 años | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | 30-49 años | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | Subtotal (2) | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | 50-59 años | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | ≥ 60 años | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | Subtotal (3) | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rifampicina | Total | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sensibilidad | Grupos de edad | n | Cloranfenicol (CIM) | | | | | |
|---------------|----------------|----|----------------------|-----|------------|---|------------|---|
| | | | Sensibles | | Intermedia | | Resistente | |
| | | | n | % | n | % | n | % |
| Cloranfenicol | < 12 meses | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | 12-23 meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | 24-59 meses | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | Subtotal (1) | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | 5-14 años | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | 15-29 años | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | 30-49 años | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | Subtotal (2) | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | 50-59 años | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | ≥ 60 años | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Cloranfenicol | Subtotal (3) | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloranfenicol | Total | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sensibilidad | Grupos de edad | n | Ciprofloxacina (CIM) | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|----------------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| | | | Sensibles | | Intermedia | | Resistente | |
| | | | n | % | n | % | n | % |
| Ciprofloxacina | < 12 meses | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | 12-23 meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | 24-59 meses | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | Subtotal (1) | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | 5-14 años | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | 15-29 años | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | 30-49 años | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | Subtotal (2) | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | 50-59 años | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | ≥ 60 años | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | Subtotal (3) | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprofloxacina | Total | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota : 4 aislamientos fueron no viables

[Volver a la página general](#)

Por favor especificar la técnica utilizada

CIM: Dilución en agar

